

Alverde®

Insekticid

ALVERDE® je je sistemski insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem u obliku koncentrovane suspenzije (SC) koji se koristi za suzbijanje štetnih insekata u povrću. Primenjuje se na otvorenom u usevima: krompira, kupusa, kelj, zeleno salati, rukoli, smeđoj slačici, kres salati i prokelju; patlidžanu i paradajzu koji se gaje na otvorenom i zaštićenom prostoru kao i paprici gajenoj u zaštićenom prostoru.



Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Obeštećenje o opasnosti: H319 Dovodi do jake iritacije oka. H361D Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod. H373 Može da dovede do oštećenja organa uz dugotrajno ili višekratno izlaganje. H382 Može da ima štetno dejstvo na odgođ. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obeštećenje o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalazu ili etiketu. P102 Čuvati van domašaja dece. P200 Nositi zaštitne rukavice. Zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P305 + P351 + P338 Ako dođe u oči: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P501 Sadržaj poslati na odlaganje. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaze do mesta namenjenog za prikupljanje različitog i specijalnog otpada.

EUH208 Može da izazove alergijsku reakciju. Sadržaj: 1,2-benzotiazol-3(2H)-on.

Dodatne oznake bezbednosti za zaštitu zdravlja ljudi i životinja i životne sredine:
SP 1 Sprječiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja i njegovom ambalazom. Uključiti za primenu sredstva za zaštitu bilja ne čisti u blizini površinskih voda. Sprječiti zagađenje putem odvodnih kanala sa poljoprivrednih površina i puteva.

SP5 Obezbeđeno je nošenje zaštitnih rukavica i štitnika za lice ili zaštitnih naočara koje dobro prijanjaju kod primene raslog rastvora i ukoliko nerazrednim sredstvom kako u zaštićenom prostoru, tako u polju i kod primene pomoću ledne sprazice.

SP63 Zbog zaštite vodenih organizama/mehanizacijom biljnih/insekata treba poljivati zone bezbednosti od 20 m do nepoljivih/vredne površine.

Zbog zaštite neželjenih organizama treba poljivati zone sigurnosti od 15 metara do nepoljivih/površine za primenu u paradajzu i patlidžanu, 5 metara do nepoljivih/površine za primenu u zelenoj salati, rukoli, kupusu, gljivicama, kelju, kelju pupčanu i smeđoj slačici.



PROIZVOĐAČ:
BASF SE, 67056 Ludwigshafen
Nemacka

ZASTUPNIK ZA SRBIJU:
BASF Srbija d.o.o., Omladinskih brigada 90 b
Novi Beograd, Republika Srbija, tel: 011/30 93 400

PAKUJE:
AGROSAVA DOO
Palma Toltaja 5/V, 11070 Beograd, tel: 011/7852 770

Broj šarže i datum proizvodnje: utisnuti na ambalazu.

REŠENJA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA: 321-01-1610/2021-11 od 21.10.2021. godine sa svim važećim izmenama i dopunama.

Rok upotrebe: 1 godina kod pravilnog skladištenja, u originalnoj zatvorenoj i neotvorenoj ambalazi.

© - REGISTROVANI ZAŠTITNI ZNAK FIRME BASF

Naziv i sadržaj aktivne supstance: metalumizon 240 g/L = 14,4 g/L.

GRUPA 22B INSEKTIKID

Supstance koje doprinose klasifikaciji: hidrazin karboksamid, etoksilat masnog alkohola.

PRIMENA: Alverde® se primenjuje folijarno, prskanjem ili orosavanjem, uz utrošak 200 – 400 L/ha (2 – 4 L na 100 m²) vode, svim tipovima ratarskih prskalica, atomizera i lednim prskalicama i koristi se kao sistemski insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem u: Krompir: za suzbijanje krompirove zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*) u koloniji 0,2 – 0,25 L/ha (2,0 – 2,5 ml/100 m²), uz utrošak 200 – 400 l/ha vode (2 – 4 L na 100 m²).
Vreme primene: kada je oko 20% larvi prve generacije izšlo iz jaja, odnosno u razvojnim fazama krompira BBCH 15 – 89.

Kupus: za suzbijanje gusenice kupusne sovice (*Mamestra brassicae*), pamukove sovice (*Helioverpa armigera*), sovice (*Plusia* sp.), kupusara (*Pieris* spp.) i kupusnog moljca (*Plutella xylostella*) u koloniji 1,0 L/ha (10 ml/100 m²), uz utrošak 200 – 400 l/ha vode (2 – 4 L na 100 m²).

Vreme primene: na početku napada gusenica u ranim razvojnim stadijima (BBCH 40 – 49).

Kelj: za suzbijanje gusenica sovice (*Spodoptera* sp.), *Plusia* sp.) i pamukove sovice (*Helioverpa armigera*) u koloniji 1,0 L/ha (10 ml/100 m²), uz utrošak 200 – 400 l/ha vode (2 – 4 L na 100 m²).

Vreme primene: na početku napada gusenica u ranim razvojnim stadijima (BBCH 40 – 49).

Zelena salata: za suzbijanje gusenica sovice (*Spodoptera* sp.), *Plusia* sp.) i pamukove sovice (*Helioverpa armigera*) u koloniji 1,0 L/ha (10 ml/100 m²), uz utrošak 200-400 l/ha vode (2 – 4 L na 100 m²).

Vreme primene: na početku napada gusenica u ranim razvojnim stadijima (BBCH 40 – 49).

Plavi patlidžan na otvorenom i u zaštićenom prostoru, za suzbijanje: sovice *Spodoptera* sp. i *Plusia* sp.; pamukove sovice (*Helioverpa armigera*), kukuruznog plamenca (*Ostrinia nubilalis*) i molja paradajza (*Tuta absoluta*) u koloniji od 1 L/ha (10 ml na 100 m²) i to na otvorenom polju na početku napada kada su gusenice u ranj fazi razvoja, a patlidžan u fazi 51-89 BBCH skale, uz utrošak vode od 200-400 L/ha i u zaštićenom prostoru na početku napada, kada su gusenice u ranj fazi razvoja, a patlidžan u fazi 15-89 BBCH, uz utrošak vode od 1000 L/ha.

Za suzbijanje krompirove zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*) u koloniji od 0,2-0,25 L/ha (2-2,5 ml/100 m²) i to na otvorenom kada je patlidžan u fazi 51-89 BBCH i u zaštićenom kada je patlidžan u fazi 15-89 BBCH skale, uz utrošak vode od 200-400 L/ha.

Paradajz na otvorenom i u zaštićenom prostoru: za suzbijanje gusenica sovice (*Spodoptera* sp., *Plusia* sp.), pamukove sovice (*Helioverpa armigera*) i molja paradajza (*Tuta absoluta*) u koloniji 1,0 L/ha (10 ml/100 m²) uz utrošak 1000 L/ha vode.

Vreme primene: u razvojnim fazama paradajza BBCH 51-89 (na otvorenom), odnosno BBCH 15 – 89 (u zaštićenom prostoru).

Paprika u zaštićenom prostoru: gusenice sovice (*Spodoptera* sp., *Plusia* sp.), pamukove sovice (*Helioverpa* sp.), kukuruznog plamenca (*Ostrinia nubilalis*) i molja paradajza (*Tuta absoluta*) u koloniji 1,0 L/ha (10 ml/100 m²) uz utrošak 1000 L/ha vode.

Vreme primene: na početku napada gusenica u ranim razvojnim stadijima (BBCH 15 – 89).

Primena u malim usevima:

Upozorenje: efikasnost i fitotoksičnost sredstva za zaštitu bilja, kod primene za male useve i manje značajne namene nisu proverene, zato odgovornost u vezi sa primenom sredstva za zaštitu bilja, preuzima korisnik sredstva.

Kres salata, rukola, smeđa slačica: za suzbijanje gusenice sovice (*Spodoptera* sp., *Plusia* sp.), i pamukove sovice (*Helioverpa* sp.), u koloniji 1,0 L/ha (10 ml/100 m²), uz utrošak 200 – 400 l/ha vode (2 – 4 L na 100 m²).

Vreme primene: na početku napada gusenica u ranim razvojnim stadijima (BBCH 40 – 49).

Prokelj: za suzbijanje gusenice kupusne sovice (*Mamestra brassicae*), pamukove sovice (*Helioverpa armigera*), sovice (*Plusia* sp.), kupusara (*Pieris* spp.) i kupusnog moljca (*Plutella xylostella*) u koloniji 1,0 L/ha (10 ml/100 m²), uz utrošak 200 – 400 l/ha vode (2 – 4 L na 100 m²).

Vreme primene: na početku napada gusenica u ranim razvojnim stadijima (BBCH 40 – 49).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Do dva puta na istoj površini u toku godine sa vremenskim intervalom od 7 dana između tretiranja.

Primena se obavlja folijarno, traktorom ili lednim prskalicama.

Karenca: 14 dana za krompir; 7 dana za zelenu salatu; 3 dana za kupus, kelj, prokelj, kres salatu, rukolu, smeđu slačicu, patlidžan u otvorenom i u zaštićenom prostoru, paradajz na otvorenom i u zaštićenom prostoru i papriku u zaštićenom prostoru.

Radna karenca: do sušenja dežofa.

"PRIPREMILJENI RASTVOR SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA UPOTREBITI ISTO DANA."

Napomene:

Zabranjeno je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama sa izvorima voda i vodonosnim delovima stanovništva.

Ne sme se primenjivati u lisnatom kelju.

Ne promenjivati sredstvo po vetromernom smeru.

Ne sme se primenjivati na krasnim, jakim peskovitim, skeletnim i svim ostalim tipovima zemljišta kod kojih je povećan rizik ispiranja u podzemne vodone, kao i površinama sklonoj eroziji, zbog oštećenja i nagomilavanja u ostacima u nižim spratovima i mogućeg zagađenja površinskih voda u području padine.

Zbog mogućeg razvoja rezistencije, ne primenjivati na istoj površini insekticide istog mehanizma delovanja.

Negativno delovanje sredstva za zaštitu bilja:

Na biljke: opoziti zagađenje na sušne useve/zagade.

Na vodene organizme: veoma toksično po vodene organizme. Može izazvati dugotrajne letne efekte u vodenoj životnoj sredini. Sprečiti dospevanje preparata u vode (vodotoči, jezera, bunari, izvoršta voda i vodonosnabveanja) i kanalizaciju mrežu.

Na vode: prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda,

(vodotoči, jezera, bunari, izvoršta voda i vodonosnabveanja), drenažnih sistema, otvorenih odvodnih sistema ili mesta gde je moguće slivanje kiše sa tretiranih površina u vodotoke, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.

Zaštitna oprema: Zaštita disajnih puteva: Odgovarajuća zaštita od udisanja pri visim koncentracijama ili pri dužem delovanju. Kombinovani filter za organske, neorganske, iselito neorganske i bazne gasove i pare. Zaštita za ruke: Odgovarajuća zaštitna rukavice otporne na hemikalije i pri dužem direktnom kontaktu: npr. nitril kaučuk, horpen kaučuk, butil kaučuk. Zaštita za oči: zaštitne naočar sa štitnicima sa strane. Zaštita lica: Sredstvo zaštite treba odabrati u zavisnosti od delatnosti i mogućeg delovanja npr. zaštitna kasećela, čizme, zaštitno odelo. Za vreme rada ne sme se jesti, piti, pušiti. Posle završetka rada, ruke i lice dobro oprati vodom i istuširati se. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći:

Nisu opisana trovanja kod ljudi. Na osnovu podataka o toksičnosti na eksperimentalnim životinjama i skromnih podataka o akutnim trovanjima ljudi, zna se da mogu da izazovu neke opšte simptome i znake trovanja, kao što su muka, gađenje, malaksalost, glavobolja a nekada i povraćanje. Ovi otrovi izazivaju i otežano i slabije kožu i izlascu sluznice očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje crvenilom konjunktiva, i suzenjem, hiperpalisacijom, grebanjem u guši i bolom u trbuhu. U slučaju potrebe za medicinskim savetom, imati pri ruci posudu ili etiketu proizvoda. U slučaju inhalacije, zatvoreni izneti na svež vazduh, a ukoliko dođe do ingestije zatvorenom dati da popije 2-3 čaše vode i odmah zatraži pomoć lekara (ne izazivati povraćanje do dolaska lekara). Ukoliko dođe do kontaminacije kože, kontaminiranu odeću odmah skinuti a kontaminirano mesto dobro oprati vodom i sapunom. Po potrebi, obratiti se za pomoć lekara. Ako je potreba medicinski savet, sa sobom poneti ambalazu i etiketu proizvoda. Ukoliko dođe do kontaminacije očiju, izvrši ispiranje (sa dosta vode) u trajanju od (najmanje) 15 minuta. Po potrebi, obratiti se za pomoć lekara (specijalisti za oči). Za metalumizon ne postoji specifičan antidot. Terapija je simptomatska. U slučaju eventualnih trovanja, za bežig uputstva o radnu lečenje konsultovati centar za kontrolu trovanja VMA – Beograd, Cirovacka 17, tel. 011/3608-440.

Mere u slučaju nezgode u zatvorenoj prostoriji: u slučaju da ima povrednih, odmah ih izneti iz prostorije i ukazati im prvu pomoć do dolaska lekara.

Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza: odmah osigurati mesto nesreće znakovima i obavestiti policiju, stručne službe i po potrebi vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće lokalizovati sredstvo da se ne razliva po zemlju i na displeju u vodu.

Skladištenje: Preparat skladištiti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na hladnom i suvom mestu, pod ključem, van domašaja dece, na temperaturama od 0 °C do 40 °C. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača.

Način čišćenja uređaja za primenu: Oruđa, depozitore i pribor oprati vrućom vodom, kojoj se doda 1-2% rastvora sode za pranje. Na kraju sve još jednom ispirati hladnom vodom.

Način ispiranja ambalaze: Ispraznjenu ambalazu potrebno je ispirati odmah nakon praznjenja, kako se sredstvo za zaštitu bilja ne bi osušilo u unutrašnjoj ambalazi. Tečnost od ispiranja (ispirati) ambalaze sipa se u rezervoar uređaja za primenu sredstva za zaštitu bilja i koristi za pripremanje rastvora za tretiranje. Ispraznjena ambalaza ispira se korišćenjem postupka trostrukog ispiranja ili postupka ispiranja pod pritiskom. Ispiranje ispraznjene ambalaze postupkom trostrukog ispiranja vrši se na sledeći način:

1) sadržaj ambalaze se isprazni u rezervoar prskalice i ostavi da se ocedi 30 sekundi; 2) doda se voda do 1/3 zapremine ambalaze;

3) ambalaza se zatvori i sadržaj zasnoju promućka, tako da voda koja do svih unutrašnjih površina;

4) zatvarati ambalaze se skinu i pusti da se voda koja je izliveno ispiranje isprazni u rezervoar uređaja za primenu sredstva za zaštitu bilja i ambalaza se ostavi 30 sekundi da se ocedi.

Postupak se ponovi još dva puta, s tim da se, ovaj put pri ponavljanju postupka ispiranja koristi čista voda, a zatim se isprana ambalaza probuši na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Ispiranje ispraznjene ambalaze postupkom pod pritiskom vrši se korišćenjem specijalnog rasprskivača koji se nalazi na uređajima za primenu sredstva za zaštitu bilja.

Ispiranje ispraznjene ambalaze postupkom pod pritiskom vrši se na sledeći način:

1) dno ili bočni zid ambalaze se probuši i na to mesto se pričvrsti specijalni rasprskivač – čista uređaja za primenu sredstva za zaštitu bilja;

2) kroz specijalni rasprskivač – diznu propušta se voda u trajanju od oko 30 sekundi;

3) po završenom ispiranju, ambalaza se ostavlja da se ocedi i osuši, probuši se na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalazu sredstva za zaštitu bilja ili u ambalazu koristiti u neke druge svrhe!

Garancija kvaliteta proizvođa: blizijim ispitivanjima je dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Obzirom da se skladištenje i primena nalaze van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti koje na to utiču, isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog skladištenja i primene.