265
67.5
65
12,5
55
120
52.5
12,5
12,5
270
12,5
5

KARENCA: 35 dana za vinovu lozu.
RADNA KARENCA: Dok se depozit preparata ne osuši (6 h nakon primene).
PRIPREMLJENI RASTVOR SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA UPOTREBITI ISTOG DANA.
NAPOMENE: Ne prskati po jakoj vrućini niti po vetru. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije (dimetoat), uljnim preparatima, kao i sa preparatima na bazi malationa, hlorpirifosa.
Primena iz vazduhoplova: Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
Negativno delovanje: Na vode (kontaminacija). Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vode (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta vode), tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih.
Zaštitna oprema: prilikom rukovanja preparatom potrebno je nositi zaštitnu odeću, zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.
Zaštita disajnih puteva: Odgovarajuća zaštita od udisanja pri višim koncentracijama ili pri dužem delovanju: Filter za čestice sa srednje velikom mogućnošću zadržavanja čvrstih i tečnih čestica. Zaštita za ruke: Odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije (EN 374), pri dužem direktnom kontaktu, npr. nitril kaučuk, hloropren kaučuk, butil kaučuk. Zaštita za oči: zaštitne naočare sa štitnicima sa strane. Zaštita tela: Sredstvo zaštite treba odabrati u zavisnosti od delatnosti i mogućeg delovanja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo. Posle rada sa preparatom, treba oprati ruke i lice sapunom i vodom. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: mučka, gađenje, malaksalost, pospanost, vrtoglavica, glavobolja, a nekad i povraćanje i dijareja. Takođe, mogući su i crvenilo, i svrab kože, iritacija sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje crvenilom konjuktiva i suzenjem, hipersalvacijom, grebanjem u grlu i bolom u stomaku. Nekada se ispoljavaju znaci nadražajnog delovanja disajnih puteva. Teška trovanja se manifestuju hipertenzijom, hiperpireksijom, hipoglikemijom, psihomotornim nemirom i disprnejom. Smrt nastupa zbog paralize respiratornog centra. Ako je potrebam medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Odstraniti zaprljanu odeću. Nakon udisanja: Mirovanje, svež vazduh, lekarska pomoć. Dodir s kožom: Temeljno isprati vodom i sapunom. Dodir s očima: Temeljno ispirati 15 minuta pod tekućom vodom otvorenih kapaka, nakradna lekarska kontrola. Gutanje: Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara. U slučaju eventualnih trovanja, za bližu uputstva o načinu lečenja konsultovati Centar za kontrolu trovanja VMA – Beograd, Crnotravska 17, tel.011 / 36-08-440.
Mere u slučaju nezgode u zatvorenoj prostoriji: u slučaju da ima povređenih, odmah ih izneti iz prostorije i ukazati im prvu pomoć do dolaska lekara. Sakupiti prosuti sadržaj.
Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza: odmah osigurati mesto nesreće znakovima i obavestiti policiju, stručne službe i po potrebi vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće lokalizovati sredstvo da se ne razliva po zemlji i da ne dospeva u vodu.
SKLADIŠTENJE: Preparat skladištiti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na prohladnom i suvom mestu, pod ključem, van domašaja dece, na temperaturama ispod 30 °C. Zaštita od požara i eksplozije: Izbegavati stvaranje prašine. Prašina u vazduhu može stvoriti eksplozivnu smešu. Predvideti mere protiv elektrostatičkog naboja - držati dalje od izvora varte - držati u pripravnosti aparate za gašenje požara.
Higijena životne sredine i uništavanje ambalaže: Oruđa, depozitore i pribor oprati vrućom vodom, kojoj se dodа 1-2% rastvora sode za pranje. Na kraju sve još jednom isprati hladnom vodom. Prazna ambalaža ni ostaci sredstva ne smeju dospeti u tlo niti u vodu, niti se smeju zakopati u zemlju. Ispražnjenu ambalažu potrebno je još jednom dobro protresti da se do kraja isprazni zatim probušiti na tri mesta i tako učiniti neupotrebljivom.
Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristiti u neke druge svrhe!
Garancija kvaliteta proizvoda: brižljivim ispitivanjem je dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Obzirom da se skladištenje i primena nalaze van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti koje na to utiču, isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog skladištenja i primene.
® REGISTROVANI ZAŠTIĆENI ZNAK FIRME BASF

EKO MODEL

BASF
We create chemistry

Cabrio® Top

Fungicid

CABRIO® TOP je fungicid, u obliku vododisperznih granula (WG).
Koristi se kao folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača oboljenja: plamenjače vinove loze i pepelnice vinove loze.

NETO SADRŽAJ **250 g**

vCabrio® Top 6/v23

8 606002 957063

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Cabrio® Top
Fungicid

Cabrio® Top je fungicid, u obliku vododisperznih granula (WG). Koristi se kao folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača oboljenja: plamenjače vinove loze i pepelnice vinove loze.

Nazivi i sadržaji aktivnih supstanci: piraklostrobin 50 g/kg, meptiram 550 g/kg.

GRUPA 11 (M3) FUNGICIDI

Broj šarže i datum proizvodnje: utisnuti na ambalaži.
Rok upotrebe: 2 godine kod pravilnog skladištenja, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

PROIZVOĐAČ: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemačka
ZASTUPNIK ZA SRBIJU: BASF Srbija d.o.o., Omladinskih brigada 90 b, Novi Beograd, Republika Srbija, tel: 011/ 30 93 400
PAKUJE: AGROSAVA DOO, Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Beograd, tel: 011/78 52 770
REŠENJA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA: 321-01-2555/2018-11 od 01.01.2020. sa svim važećim izmenama i dopunama.
NAMENA: Cabrio® Top se koristi kao folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača oboljenja:
1) plamenjače vinove loze *(Plasmopara viticola)*, i to kada je vinova loza u fazi pred cvetanje (faze 11-19 BBCH skale) pa do početka sazrevanja bobica (faze 81-83 BBCH skale);
2) pepelnice vinove loze *(Uncinula necator)*, i to preventivno pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Preporučuje se i primena u bloku (2-3 tretiranja), pred i u vreme postojanja najvećeg rizika od pojave i širenja oboljenja i to u koncentraciji 0,15% - 0,20%, odnosno 15-20 grama u 10 L vode.
Interval između dva tretiranja treba da bude: 12 do 14 dana, a u uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih vremenskih uslova za širenje oboljenja 10 dana.

Obaveštenja o opasnosti: H302 Štetno ako se proguta, H315 Izaziva iritaciju kože, H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja, H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Obaveštenja o merama predostrožnosti: P280 Nositi zaštitne rukavice, P260 Ne udisati prašinu/gas/magluparu. P264 Nakon upotrebe detaljno oprati zaprljane delove tela. P311 Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. P303+P352 Ako dospe na kožu (ili na kosu): Oprati sa puno sapuna i vode. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže do mesta namenjenog za prikupljanje ričnog ili specijalnog otpada. EUH 208 Može da izazove alergijsku reakciju. Sadrži meptiram.
Dodatne oznake bezbednosti za zaštitu zdravlja ljudi i životinja i životne sredine: SP1 Sprečiti zagađenje vode sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom; Uređaje za primenu sredstva za zaštitu bilja ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagađenje putem odvodnih kanala sa poljoprivrednih površina i puteva. Spoz Posle primene sredstva za zaštitu bilja oprati zaštitnu odeću.



Utrošak vode: 600-1.000 L/ha (6-10 L vode na 100 m²)
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Tri do četiri puta.
Način primene: Preparat se primenjuje prskanjem i orošavanjem, traktorskim atomizerima (nošenim i vučenim), ledrim atomizerima kao i svim tipovima ledrih prskalica.