



We create chemistry

Navura™

Fungicid

Navura® je fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovala bolesti ozime i jare pšenice, durum pšenice, spelte, ozimog i jarog ječma, raži i tritikalea. Na tržištu se nalazi u obliku koncentrata za emulziju (EC).

5 L

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.



TM = zaštitni znak kompanije BASF
81183779 RS 2085



Navura®

Primena: **Navura®** je fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovaca sledećih gljivičnih oboljenja u žitaricama:

Kultura	Prouzrokovac oboljenja	Maksimalni broj tretmana	Količina primene		Vreme tretiranja (prema fenofazi)
			doza (l/ha)	količina vode (l/ha)	
ozima pšenica, jara pšenica, durum pšenica, spelta	siva pegavost lista (<i>Zymoseptoria tritici</i>), smeđa lisna rđa (<i>Puccinia tritica</i>) pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>), mrežasta pegavost (<i>Pyrenophora tritici</i>), trulež stabljike (<i>Oculimacula yallundae</i>) i fuzarioza klasa (<i>Fusarium spp.</i>)	1	1,0-1,5	100-300	od početka rasta stabljike (BBCH 30) do kraja cvetanja (BBCH 69)
ječam (ozimi i jari)	mrežasta pegavost (<i>Pyrenophora teres</i>), pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>)	1	1,0-1,5	100-300	od početka rasta stabljike (BBCH 30) do kraja cvetanja (BBCH 69)
raž	smeđa rđa (lisna rđa) (<i>Puccinia recondita</i>)	1	1,0-1,5	100-300	od početka rasta stabljike (BBCH 30) do kraja cvetanja (BBCH 69)
tritikale	siva pegavost lista (<i>Zymoseptoria tritici</i>), smeđa rđa (lisna rđa) (<i>Puccinia recondita</i>), pepelnica (<i>Erysiphe graminis</i>)	1	1,0-1,5	100-300	od početka rasta stabljike (BBCH 30) do kraja cvetanja (BBCH 69)

U žitaricama (ozima i jara pšenica, durum pšenica, spelta, ozimi i jari ječam, raž, tritikale) na osnovu prognoze zaštite od pepelnice, pegavosti lista i od rđa, potrebno je započeti preventivno. U usevu pšenice, na osnovu prognoze zaštite od truleži stabljike potrebno je izvršiti od početka rasta stabljike (BBCH 30). Primenu zaštite od fuzarioze klasa, takođe na osnovu prognoze opravdano je izvršiti na početku cvetanja. U uslovima predispozicije za infekciju, preporučuje se primena veće doze (1,5 L/ha).

Karenca: 35 dana

Radna karenca: Do sušenja depozita.

Napomene:

Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pre pauze i kraja rada oprati ruke i/ili lice.

Negativno delovanje:

Na biljke: Nije fitotoksičan za tretirani usev ukoliko se primenjuje u skladu sa preporukama.

Na organizme u vodi (toksičnost): Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Sprečiti dospevanje sredstva za zaštitu bilja u vode (vodotoci, jezera, izвориšta voda i bunari) i kanizacionu mrežu.

Na vode (kontaminacija): Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vode (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih.

Antirezistentna strategija:

Da bi se sprečio razvoj rezistencije, preparat treba koristiti preventivno, imajući u vidu smernice integrisane tehnologije zaštite bilja potrebno je primeniti uz primenu drugih tehnika zaštite. Prilikom tretiranja sredstvima za zaštitu bilja potrebno je rotaciono nanositi sredstvo sa fungicidima koji sadrže aktivne sastojke različitog mehanizma delovanja.

Količina preparata za prskanje mora biti odabrana u okviru navedenih vrednosti u zavisnosti od načina gajenja, veličine površine biljke koja se štiti i vrste sredstava za zaštitu bilja koja se koristi. Tokom tretmana potrebno je težiti potpunom i ravnomernom pokrivanju kulture preparatom za prskanje.

Preventivne mere:

Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. Radnici mogu biti izloženi tokom proizvodnje ili primene u poljoprivredi, što se može sprečiti korišćenjem odgovarajuće lične zaštitne opreme. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Oprati zaprljane delove tela detaljno nakon rukovanja.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći:

Toksični efekti su minimalni i kratkotrajni, sa povlačenjem simptoma nakon prekida ekspozicije. Nakon ingestije mogu dovesti do mučnine, povraćanja, opšte slabosti i malaksalosti.

Prva pomoć i lečenje:

U slučaju udisanja: izneti eksponiranu ili otrovanu osobu na čist vazduh.

U kontaktu sa kožom: skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Kožu obilno isprati vodom i sapunom. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: potražiti medicinski savet/posmatranje.

U kontaktu sa očima: obilno isprati oči vodom u trajanju od 15 minuta. Pre toga ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje. Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/posmatranje.

U slučaju ingestije: ukoliko je osoba svesna i sarađuje isprati usta i dati da popije 2-3 čaše vode. Ukoliko postoji poremećaj svesti, potrebna je intubacija zbog zaštite disajnih puteva. Nakon toga dati medicinski ugalj. Primeniti simptomatske i potporne mere. **ZABRANJENO** izazivanje povraćanja!

Nije poznat ni jedan specifičan antidot.

U slučaju eventualnih trovanja, za bliža uputstva o načinu lečenja konsultovati Centar za kontrolu trovanja VMA – Beograd, Crnotravska 17, tel. 011/36-08-440.

Mere u slučaju nezgode u zatvorenoj prostoriji:

U slučaju da ima povređenih, odmah ih izneti iz prostorije i ukazati im prvu pomoć do dolaska lekara.

Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza:

Odmah osigurati mesto nesreće znakovima i obavestiti policiju, stručne službe i po potrebi vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće lokalizovati sredstvo da se ne razliva po zemlji i da ne dospeva u vodu. Sakupiti prosuti sadržaj.

Higijena životne sredine:

Ne prskati po jakoj vrućini niti po vetru.

Skladištenje:

Preparat skladištiti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na prohladnom i suvom mestu, pod ključem, van domašaja dece. Čuvati dalje od toplote i zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Način ispiranja ambalaže

Ispraznjenu ambalažu potrebno je isprati odmah nakon pražnjenja, kako se sredstvo za zaštitu bilja ne bi osušilo u unutrašnjosti ambalaže. Tečnost od ispiranja (ispirak) ambalaže sipa se u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i koristi za pripremanje rastvora za tretiranje.

Ispraznjena ambalaža ispira se korišćenjem postupka trostrukog ispiranja ili postupka ispiranja pod pritiskom. Ispiranje ispraznjene ambalaže postupkom trostrukog ispiranja vrši se na sledeći način:

1. sadržaj ambalaže se isprazni u rezervoar prskalice i ostavi da se ocedi 30 sekundi;
2. doda se voda do 1/3 zapremine ambalaže;
3. ambalaža se zatvori i sadržaj snažno promućka, tako da voda dođe do svih unutrašnjih površina;
4. zatvarač ambalaže se skine i pusti se da voda kojom je izvršeno ispiranje iscuri u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i ambalaža se ostavi 30 sekundi da se ocedi. Postupak se ponovi još dva puta, s tim da se, svaki put pri ponavljanju postupka ispiranja koristi čista voda, a zatim se isprana ambalaža probuši na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Ispiranje ispraznjene ambalaže postupkom pod pritiskom vrši se korišćenjem specijalnog raspršivača koji se nalazi na uređajima za primenu sredstava za zaštitu bilja. Ispiranje ispraznjene ambalaže postupkom pod pritiskom vrši se na sledeći način:

1. dno ili bočni zid ambalaže se probuši i na to mesto se pričvrsti specijalni rasprskivač – dizna uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja;
2. kroz specijalni rasprskivač – diznu propušta se voda u trajanju od oko 30 sekundi;
3. po završenom ispiranju, ambalaža se ostavlja da se ocedi i osuši, probuši se na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristi u neke druge svrhe!

Garancija kvaliteta proizvoda

Brižljivim ispitivanjem je dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Obzirom da se skladištenje i primena nalaze van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti koje na to utiču,

isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog skladištenja i primene.



We create chemistry

Navura™

Fungicid

Navura® je fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovala bolesti ozime i jare pšenice, durum pšenice, spelte, ozimog i jarog ječma, raži i tritikalea. Na tržištu se nalazi u obliku koncentrata za emulziju (EC).

5 L

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

™ = zaštitni znak kompanije BASF
81183779 RS 2085