



We create chemistry

Pictor® Revy

Fungicid

Pictor® Revy je fungicid preventivnog i kurativnog delovanja, namenjen suzbijanju prouzrokovaca bolesti **uljane repice** (ozime i jare) i **suncokreta**. Na tržištu se nalazi u obliku koncentrovane suspenzije (SC).

5 L

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.



® = registrovani zaštićeni znak firme BASF
81184532 RS 2085



Primena:

Pictor® Revy je fungicid preventivnog i kurativnog delovanja namenjen suzbijanju prouzrokača bolesti uljane repice (ozime i jare) i suncokreta.

Kultura	Prouzrokač oboljenja	Maksimalan broj tretmana godišnje	Minimalno vreme (dan) između dva tretmana	Količina primene		Vreme tretiranja prema fenofazi
				Preparat (l/ha)	Voda (l/ha)	
Uljana repica (ozima i jara)	Bela trulež (<i>Sclerotinia Sclerotiorum</i>), Crna pegavost (<i>Alternaria brassicae</i>)	1	-	0,6-1,0 l/ha	100-400	Od faze potpunog odvajanja cvetne glavice od lisne mase (57 BBCH) do faze kada je 50% mahuna dostiglo krajnju veličinu (75 BBCH)
Suncokret	Bela trulež (<i>Sclerotinia Sclerotiorum</i>), Sivo mrka pegavost suncokreta (<i>Diaporthe helianthi</i>), Siva trulež korena i rak stabljike (<i>Phoma lingam</i>), Crna pegavost (<i>Alternaria spp.</i>)	2	7	0,6-1,0 l/ha	100-400	Od faze kada su vidljive prve izdužene internodije (31 BBCH) do kraja cvetanja (69 BBCH).

Kod **uljane repice** (ozime i jare) zaštitu od Sklerocinije i Alternarije treba odraditi preventivno u vreme cvetanja, saglasno prognozno izveštajnoj službi. Ukoliko se očekuju vremenski uslovi koji će pogodovati većoj pojavi Alternarie, preporučuje se korišćenje maksimalne doze od 1,0 L/ha.

Kod **suncokreta** zaštitu od bolesti listova i stabla potrebno je započeti preventivno, na osnovu prognoze, ali najkasnije do pojave prvih simptoma. Preporučena je primena maksimalne doze od 1L/ha u uslovima koji pogoduju pojavi Alternarie i Phomae.

Preparat se kod suncokreta primenjuje jednom kada je cvetna glavica još zatvorena (59 BBCH), a može se ponoviti još jednom u toku perioda cvetanja (61-69 BBCH).

Karenca: Obezbeđena vremenom primene.

Radna karenca: Do sušenja depozita.

Tretiranje iz vazduhoplova: Nije dozvoljeno.

Napomene:

Primena DMI fungicida (npr. triazola) i insekticida u cvetajućim usevima tokom cvetanja nije dozvoljena, te se primena navedene kombinacije preporučuje isključivo noću.

Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pre pauze i kraja rada oprati ruke i/ili lice.

Negativno delovanje:

Na biljke: Nije fitotoksičan za tretirani usev ukoliko se primenjuje u skladu sa preporukama.

Na organizme u vodi (toksičnost): Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Sprečiti dospevanje sredstva za zaštitu bilja u vode (vodotoci, jezera, izvorišta voda i bunari)mi kanalizacionu mrežu.

Na vode (kontaminacija): Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vode (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih.

Preventivne mere:

Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. Radnici mogu biti izloženi tokom proizvodnje ili primene u poljoprivredi, što se može sprečiti korišćenjem odgovarajuće lične zaštitne opreme. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Oprati zaprljane delove tela detaljno nakon rukovanja.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći:

Toksični efekti su minimalni i kratkotrajni, sa povlačenjem simptoma nakon prekida ekspozicije. Nakon ingestije mogu dovesti do mučnine, povraćanja, opšte slabosti i malaksalosti.

Prva pomoć i lečenje:

U slučaju udisanja: izneti eksponiranu ili otrovanu osobu na čist vazduh.

U kontaktu sa kožom: skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Kožu obilno isprati vodom i sapunom. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: potražiti medicinski savet/posmatranje.

U kontaktu sa očima: obilno isprati oči vodom u trajanju od 15 minuta. Pre toga ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje. Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet /posmatranje.

U slučaju ingestije: ukoliko je osoba svesna i sarađuje isprati usta i dati da popije 2-3 čaše vode. Ukoliko postoji poremećaj svesti, potrebna je intubacija zbog zaštite disajnih puteva. Nakon toga dati medicinski ugalj. Primeniti simptomatske i potporne mere. **ZABRANJENO** izazivanje povraćanja! Nije poznat ni jedan specifičan antidot.

U slučaju eventualnih trovanja, za bliža uputstva o načinu lečenja konsultovati Centar za kontrolu trovanja VMA – Beograd, Crnotravska 17, tel. 011/36-08-440.

Mere u slučaju nezgode u zatvorenoj prostoriji:

U slučaju da ima povređenih, odmah ih izneti iz prostorije i ukazati im prvu pomoć do dolaska lekara.

Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza:

Odmah osigurati mesto nesreće znakovima i obavestiti policiju, stručne službe i po potrebi vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće lokalizovati sredstvo da se ne razliva po zemlji i da ne dospeva u vodu. Sakupiti prosuti sadržaj.

Higijena životne sredine:

Ne prskati po jakoj vrućini niti po vetru.

Skladištenje:

Preparat skladištiti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na prohladnom i suvom mestu, pod ključem, van domašaja dece. Čuvati dalje od toplote i zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Način ispiranja ambalaže

Ispražnjenu ambalažu potrebno je isprati odmah nakon pražnjenja, kako se sredstvo za zaštitu bilja ne bi osušilo u unutrašnjosti ambalaže. Tečnost od ispiranja (ispirak) ambalaže sipa se u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i koristi za pripremanje rastvora za tretiranje.

Ispražnjena ambalaža ispira se korišćenjem postupka trostrukog ispiranja ili postupka ispiranja pod pritiskom. Ispiranje ispražnjene ambalaže postupkom trostrukog ispiranja vrši se na sledeći način:

1. sadržaj ambalaže se isprazni u rezervoar prskalice i ostavi da se ocedi 30 sekundi;
2. doda se voda do 1/3 zapremine ambalaže;
3. ambalaža se zatvori i sadržaj snažno promućka, tako da voda dođe do svih unutrašnjih površina;

4. zatvarač ambalaže se skine i pusti se da voda kojom je izvršeno ispiranje iscure u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i ambalaža se ostavi 30 sekundi da se ocedi. Postupak se ponovi još dva puta, s tim da se, svaki put pri ponavljanju postupka ispiranja koristi čista voda, a zatim se isprana ambalaža probuši na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Ispiranje ispražnjene ambalaže postupkom pod pritiskom vrši se korišćenjem specijalnog raspršivača koji se nalazi na uređajima za primenu sredstava za zaštitu bilja. Ispiranje ispražnjene ambalaže postupkom pod pritiskom vrši se na sledeći način:

1. dno ili bočni zid ambalaže se probuši i na to mesto se pričvrsti specijalni rasprskivač – dizna uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja;
2. kroz specijalni rasprskivač – diznu propušta se voda u trajanju od oko 30 sekundi;
3. po završenom ispiranju, ambalaža se ostavlja da se ocedi i osuši, probuši se na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristi u neke druge svrhe!

Garancija kvaliteta proizvoda

Brižljivim ispitivanjem je dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Obzirom da se skladištenje i primena nalaze van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti koje na to utiču, isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog skladištenja i primene.



We create chemistry

Pictor® Revy

Fungicid

Pictor® Revy je fungicid preventivnog i kurativnog delovanja, namenjen suzbijanju prouzrokovaca bolesti **uljane repice** (ozime i jare) i **suncokreta**. Na tržištu se nalazi u obliku koncentrovane suspenzije (SC).

5 L

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

® = registrovani zaštićeni znak firme BASF
81184532 RS 2085