



■ BASF

We create chemistry


Revystar[®] XL

Za kraljicu samo premijum

Revystar® XL

Za kraljicu samo premijum


AKTIVNA MATERIJA:	FORMULACIJA:
Revysol® 100 g/l Xemium® 50 g/l	Koncentrat za emulziju (EC)
REGISTROVANA DOZA:	REGISTROVANO VREME PRIMENE:
0,7 – 1,0 l/ha	od potpunog zatvaranja redova (BBCH 39) do kraja razvoja korena (BBCH 49)
PREPORUČENA DOZA:	SPEKTAR DELOVANJA:
1 l/ha	<i>Cerospora beticola</i> <i>Erysiphe cruciferarum</i> <i>Uromyces betae</i> <i>Ramularia beticola</i>
BROJ PRIMENA U VEGETACIJI:	
2	




KOMBINACIJA

Xemium® i Revysol® predstavlja novi standard za kontrolu cercospore uključujući i rezistentne sojeve!

Osetljivi sojevi




Višestruko rezistentni sojevi (strobilurin + triazol)



REVYSTAR® XL efikasno suzbija i druge bolesti šećerne repe


Snažan protiv pepelnice




Nemačka, Danska, Francuska, Slovačka 2018 – 2022
Broj oglada 9 | Ocena 27 – 49 dana nakon tretmana




Snažan protiv rđe




Nemačka, Danska, Francuska, Velika Britanija 2018 – 2022
Broj oglada 13 | Ocena 27 – 49 dana nakon tretmana



Snažan protiv ramularije



Litvanija, Poljska, Francuska 2018 – 2022
Broj oglada 4 | Ocena 27 – 49 dana nakon tretmana




REVYSTAR® XL

za veće prinose i digestiju



Štiti prinos

Stabilni i visoki prinosi potvrđeni su u mnogobrojnim primerima iz prakse.



Ogledi sprovedeni u 11 zemalja (NL, PL, RO, SK, UK, CZ, DE, DK, FR, HU, LT)
Ukupan broj ogleda 39



Pozitivan uticaj na sadržaj šećera (digestija)

+0,5%

Ogledi merenja sadržaja šećera sprovedeni u 13 zemalja (CZ, DE, DK, FI, FR, HU, LT, NL, PL, RO, SE, SK, UK)
Prosek iz ukupno 75 ogleda



Preporuke

Pre svega, dobar monitoring koji podrazumeva: redovne obilaske useva, praćenje vremenskih uslova i intenziteta primarne infekcije, pojavu prvih simptoma bolesti i prisutnost rezistentnosti na svakom polju.



Pravovremenost: tretmane najbolje započeti odmah po uočavanju prvih pega cercospore.

Dinamika prskanja: broj tretmana i vremenski razmak između tretmana prilagoditi uslovima za širenje bolesti.

Rešenja koja pokazuju najjaču agresivnost prema cercospori treba primeniti u prvim tretmanima kako bi maksimalno umanjili infektivni potencijal od samog početka.

Primena svih sistemika obavezno u kombinaciji sa fungicidima na bazi bakra.

U programu zaštite kombinovati različite mehanizme delovanja i različite aktivne materije (izbegavati uzastopne tretmane istim preparatom).





We create chemistry

VAŠA PODRŠKA NA TERENU

MILAN MAŠIĆ

Stručna i tehnička podrška i
predstavnik prodaje za Južnu Bačku

+381 63 416 321

milan.masic@basf.com

GORAN PUHAR

Predstavnik prodaje za region
Srednjeg i Južnog Banata

+381 63 457 703

goran.puhar@basf.com

VUČKO BUŠATOVIĆ

Predstavnik prodaje
za Južni Banat i Beograd

+381 63 314 479

vucko.busatovic@basf.com

LASLO SILADJI

Predstavnik prodaje za
Severni Banat i Severnu Bačku

+381 63 310 163

laslo.siladji@basf.com

NEMANJA IVKOVIĆ

Predstavnik prodaje
za Zapadnu i Severnu Bačku

+381 63 313 375

nemanja.ivkovic@basf.com

DRAGAN POZANAN

Predstavnik prodaje
za Južnu Bačku

+381 62 416 084

dragan.poznan@basf.com

MILAN MITROVIĆ

Predstavnik prodaje
za Srem i Mačvu

+381 63 652 167

milan.mitrovic@basf.com

LJUBIŠA MILENKOVIĆ

Predstavnik prodaje
za Centralnu i Južnu Srbiju

+381 63 312 068

ljubisa.milenkovic@basf.com

ĐORĐE NIKOLIĆ

Predstavnik prodaje
za Centralnu Srbiju

+381 62 800 4319

djordje.nikolic@basf.com

BASF Srbija d.o.o.

Omladinskih brigada 90b

11070 Novi Beograd, Srbija

www.agro.basf.rs

BASF Poljoprivredna rešenja

Ova brošura je informativnog karaktera.

Pre upotrebe sredstava za zaštitu bilja

obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

© - registrovani zaštićeni znak firme BASF SE.