



The Chemical Company

# Acrobat® MZ WG

**AKTIVNE SUPSTANCE:** 90 g/kg dimetomorf i 600 g/kg mankozeb

**FORMULACIJA:** vodotopive granule (WG)

**PAKOVANJE:** 20 g, 200 g, 1 kg i 25 kg

**PROIZVOD:** Acrobat® MZ WG je preventivni i kurativni fungicid.

USEV	KOLIČINA/KONC. PRIMENE	SPEKTAR DELOVANJA
Paradajz	2,0 - 2,5 kg/ha	plamenjača ( <i>Phytophthora infestans</i> ), crna pegavost ( <i>Alternaria solani</i> )
Krompir	2,0 - 2,5 kg/ha	plamenjača ( <i>Phytophthora infestans</i> ), crna pegavost ( <i>Alternaria solani</i> )
Krastavac	0,20 - 0,25 %	plamenjača ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )
Vinova loza	0,20 - 0,25 %	plamenjača ( <i>Plasmopara viticola</i> )
Duvan	2,0 kg/ha	plamenjača duvana ( <i>Peronospora tabacina</i> )

#### VРЕМЕ ПРИМЕНЕ:

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti). Kasnije, u zavisnosti od vremenskih uslova, nastaviti sa tretiranjem u sledećim intervalima: kišni period na 7-10 dana, sušni period 10-14 dana.

#### ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИМЕНУ:

Acrobat® MZ WG je preparat kontaktnog i dubinskog delovanja. Lokalni je sistemik, tako da se rasprostire unutar lišća i osigurava njegovu potpunu zaštitu. Na delovanje preparata posebno su osetljivi stadijumi stvaranja sporangiospora i zoospora. Zato, tretman preparatom Acrobat® MZ WG pre početka stvaranja spora u potpunosti zaustavlja oboljenje.

#### KARENCA:

Za paradajz, krompir i krastavac 14 dana,  
Za vinovu lozu 42 dana, a za duvan 21 dan

#### PREDNOSTI ПРИМЕНЕ:

- ✓ Acrobat® MZ WG sprečava zarazu biljaka, zahvaljujući kombinaciji dubinskog i kontaktnog delovanja
- ✓ Acrobat® MZ WG ima dugo rezidualno delovanje i otporan je na ispiranje kišom
- ✓ Nov mehanizam delovanja isključuje opasnost od nastanka ukrštene rezistentnosti sa fenilamidima
- ✓ Acrobat® MZ WG pripada III grupi otrova, pa je kao takav bezbedan za korisne organizme i životnu sredinu



## Acrobat® MZ WG



