



The Chemical Company

# Cabrio® Top

**AKTIVNE SUPSTANCE:** 50 g/kg piraklostrobin i 550 g/kg metiram

**FORMULACIJA:** vodotopive granule (WG)

**PAKOVANJE:** 25 g, 250 g i 1 kg

**PROIZVOD:** Cabrio® Top je folijarni fungicid sa protektivnim delovanjem i mogućnošću redistribucije.

**USEV:**  
vinova loza

**KONCENTRACIJA PRIMENE:**  
0,15 - 0,20%

**SPEKTAR DELOVANJA:**  
plamenjača (*Plasmopara viticola*),  
pepelnica (*Uncinula necator*)

**VРЕМЕ ПРИМЕНЕ:**  
Preparatom Cabrio® Top tretiranja se obavlaju od faze pre cvetanja do početka sazrevanja bobica u intervalu od 12 do 14 dana. U slučaju visokog infektivnog potencijala i izrazito povoljnih uslova za širenje plamenjače interval bi trebalo skratiti na 7 do 10 dana. Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 3 do 4 puta. Pri pravilnoj primeni ne postoji bojazan od fitotoksičnosti.

**MEХАНИЗАМ ДЕЛОВАЊА:**  
Cabrio® Top ima dvostruki način delovanja: kontaktno, karakteristično za aktivnu materiju metiram i kvazi-sistemično delovanje karakteristično za grupu stro-bilurina. Metiram je nesistemik, deluje protektivno na prouzrokovace oboljenja tako što inhibira disanje, odnosno SH-enzime. Pyraclostrobin deluje na taj način što inhibira transport elektrona u respiratornom lancu (kompleks III). Na taj način se sprečava klijanje spora. Cabrio® Top kao spoj dve aktivne materije omogućava i dva različita načina delovanja što obezbeđuje

sigurnu zaštitu vinove loze bez bojazni od pojавljivanja rezistentnosti na preparat. Time se obezbeđuje protektivno i dugo rezidualno delovanje preparata.

**KARENCA:**  
Za vinovu lozu iznosi 35 dana

**PРЕДНОСТИ ПРИМЕНЕ:**  
Cabrio® Top ima karakterističan način delovanja:

- ✓ Odlično deluje protiv prouzrokovaca plamenjače (*Plasmopara viticola*) i pepelnice (*Uncinula necator*) vinove loze
- ✓ Obezbeđuje podjednako dobру zaštitu i lista i grozda vinove loze
- ✓ Preparat ima dugo rezidualno delovanje (interval između dva prskanja je 14 dana)
- ✓ Nema opasnosti od spiranja kišom
- ✓ Nema fitotoksičnosti na listu i grozdu
- ✓ Nema negativnog uticaja na fermentaciju i ukus grožđa i vina
- ✓ Odlična selektivnost na sve testirane sorte vinove loze
- ✓ Nema znakova rezistentnosti jer je piraklostrobin nova aktivna supstanca, a u kombinaciji sa preventivnim preparatom (metiram) predstavlja jednu od najvažnijih karika u antirezistentnoj strategiji

**ПОСЕБНА НАПОМЕНА:**  
Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti)