

# Bellis®

PRIDRŽAVATI SE UPUTSTVA ZA UPOTREBU DA BI SE IZBEGLI RIZICI PO  
ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU.

Bellis® je sistemični fungicid sa preventivnim delovanjem, u obliku vododisperznih granula (WG).

**Primenjuje se u zasadima:**

- **jabuke** za suzbijanje prouzrokovala pepelnice jabuke , truleži plodova i čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i
- **kruške** za suzbijanje prouzrokovala čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova kruške.

**PROIZVOĐAČ:** BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemačka.

**ZASTUPNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:** BASF Srbija d.o.o., Omladinskih brigada 90 b,  
Novi Beograd, Republika Srbija, tel: 011/ 30 93 400.

**REŠENJA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA: 321-01-646/2011-11 od 22/11/2011. I  
321-01-2587/2013-11 od 31.12.2013.**

**ZASTUPNICI I DISTRIBUTERI ZA BOSNU I HERCEGOVINU:**

NOVOPROM d.o.o., Cara Lazara bb, Modriča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina,  
tel: +387 53 82 03 33.

SJEMENARNA d.o.o., Obilazna cesta 27, 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina,  
tel: +387 39 700 000.

**RJEŠENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE: 12.03.3-330-577/14 od 12.03.2014.**

**Naziv i sadržaj aktivnih supstanci:** boskalid 252 g/kg, piraklostrobin 128 g/kg

**Broj šarže i datum proizvodnje:** utisnuti na ambalaži

**Rok upotrebe:** 2 godine kod pravilnog skladištenja, u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

**Obaveštenje o opasnosti:** H319 Dovodi do jakе iritacije oka, H302 Štetno ako se proguta, H400 Veoma toksično po živi svet u vodi, H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

**Obaveštenja o merama predostrožnosti:** P280b Nosit zaštitne naočare, P301 + P312 Ako se proguta: Pozvati Centar za potrošača ili lekara, ukoliko se ne osećate dobro, P305 + P351 + P338 Ako dospe u oči: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem, P330 Isprati usta, P391 Sakupiti prosutu sadržaj P501 Odlađivanje sadržaja/ambalaže do mesta namenjenog za prikupljanje rizičnog ili specijalnog otpada.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**PRIMENA:** Bellis® je sistemični fungicid sa preventivnim delovanjem. Primjenjuje se folijarno, prskanjem ili orušavanjem, u zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovala oboljenja: pepelnice jabuke (*Podosphaera leucotricha*), truleži plodova (*Monilinia spp*) i čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (*Venturia inaequalis*) i u zasadu kruške za suzbijanje prouzrokovala čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova kruške (*Venturia pirina*).

**Vreme primene:**

Za suzbijanje prouzrokovala pepelnice jabuke (*Podosphaera leucotricha*): tokom vegetacije (BBCH 54-85), i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.

Za suzbijanje prouzrokovala truleži plodova (*Monilinia spp*) primjenjuje se tokom zrenja (faza 81-87 BBCH skale), preventivno.

Za suzbijanje prouzrokovala čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (*Venturia inaequalis*) tokom vegetacije (BBCH 54-85), i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.

Za suzbijanje prouzrokovala i prouzrokovala čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova kruške (*Venturia pirina*) tokom vegetacije (BBCH 54-85), i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.

**Količina primene:** 0,8 kg/ha (8 g na 100 m<sup>2</sup>).

**Utrošak vode:** 1000 L/ha (10 L na 100 m<sup>2</sup>).

**Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini:** Tri puta.

**NAPOMENE:** Ne prskati po jakoj vrućini niti po vetru.Zbog moguće rezistentnosti jabuke i kruške na Qol-fungicide u kritičnom periodu (faza 56/59-71/73 BBCH skale) voditi računa da njihov ukupan broj tretiranja ne pređe tri puta u toku jedne vegetacione sezone.

## **Negativno delovanje:**

**Na biljke:** Nema negativnih delovanja.

**Na organizme u vodi (otrovnost):** Veoma otrovan za vodene organizme. Sprečiti dospevanje preparata u vode (vodotoci, jezera, bunari, izvorišta voda i vodosnabdevanja) i kanalizacionu mrežu. Može prouzrokovati dugotrajna neženjena dejstva na vodenu sredinu.

**Na vode (kontaminacija):** Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i spreciti kontaminaciju vode (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih.

## **Mešanje sa drugim pesticidima**

**Kompatibilnost (mogućnost mešanja):** preparat Bellis se bez problema meša sa većinom insekticida i fungicida. Ne sme se mešati sa izrazito alkalnim preparatima.

**Primena iz vazduhoplova:** Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

**Karenca:** 7 dana za jabuku i krušku

**Radna karenca:** Do sušenje depozita

## **Zaštitna oprema:**

**Zaštita disajnih puteva:** Odgovarajuća zaštita od udisanja pri višim koncentracijama ili pri dužem delovanju. Filter za čestice sa srednje velikom mogućnošću zadržavanja čvrstih i tečnih čestica.

**Zaštita za ruke:** Odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije i pri dužem direktnom kontaktu: npr. nitril

kaučuk (0,4mm), hlorpren kaučuk (0,5mm), butil kaučuk.

**Zaštita za oči:** zaštitne naočare sa štitnicima sa strane.

**Zaštita tela:** Sredstvo zaštite treba odabrati u zavisnosti od delatnosti i mogućeg delovanja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo. Za vreme rada ne sme se jesti, piti, niti pušiti. Posle završetka rada, ruke i lice dobro oprati vodom i sapunom, i istuširati se.

## **Sимптоми тројава, указивање прве помоћи лечење:**

Od simptoma trojave mogu se javiti malaksalost, mučnina, гадење, повраћање, проливи, убрзано дисање, поспаност, главоболја, вртоглавица и несигуран ход. У контакту са очима може да изазове црвено и сузенje.

**Прва помоћ:** код пероралног тројава изазивати повраћање. У slučaju inhalacije потребно је прекинuti експозицију. Код perkutanih тројава se препоручује купanje и пресвлачење. Уколико доспе у око исрати обилно чистом водом.

**Лечење:** lavaža želuca nazogastričnom sondom, medicinski ugalj (30 g), simptomatska терапија, инфузији раствори, а по потреби и мере кардиопулмоналне реанимације. У slučaju тројава или појаве симптома након употребе овог средства, обавезно се јавити надлеžном лекару са овим упутством. Лекар или пациент могу консултовати токсиколога у Центру за контролу тројава VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011/3608-440, ради добијања детаљнијих информација, стручне консултације и препоруке за dalji tretman zatrivanog.

**Мере у slučaju nezgode u zatvorenoj prostoriji:** u slučaju da ima povređenih, odmah ih izneti iz prostorije i ukazati im prvu pomoć do dolaska lekara.

**Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza:** odmah osigurati место несреће znakovima i obavestiti полицију, стручне службе i по потреби vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće lokalizovati средство da se ne razliva po zemlji i da ne dospeva u vodu.

**Skladištenje:** Препарат складишти у оригиналном затвореном паковању, у posebnoj prostoriji одвојено од ljudske i stočne hrane, na prohladnom i suvom mestu, pod ključem, van domaćaja dece. Prodaja je dozvoljena само у оригиналном паковању производa.

**Higijena životne sredine i uništavanje ambalaže:** Oruda, depozitore i pribor oprati vrućom vodom, којој se doda 1-2% rastvora sode za pranje. На kraju sve još jednom исрати хладном водом. Празна ambalaža ni ostaci sredstva ne smiju dospeti u tlo niti u vodu, niti se smiju zakopati u zemlju. Ispraznjenu ambalažu потребно је јос једном добро протести да се до kraja isprazni i затим probušiti на три места i tako učini neupotrebljivom.

**Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristi u neke druge svrhe!**

**Garancija kvaliteta proizvoda:** brižljivim испитивањем је dokazano да је производ pogодан за препоручене сврхе, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Obzirom da se складиштење i примена налазе van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti koje na to utiču, isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog складиштења i примене.