

Goliath® Gel

Uputstvo za upotrebu:

Goliath® Gel je gel efikasan protiv: *Blattella germanica*- smeđa bubašvaba, *Blatta orientalis*-obična bubašvaba, *Periplaneta americana*-crna bubašvaba. Deluje kako na nimfe, tako i na odrasle jedinice.

Goliath® Gel može da se koristi za kontrolu bubašvaba u: stambenim objektima, uključujući kućinju; prostorima za obradu hrane i skladištenje, pogonima za proizvodnju hrane, restoranima, magacinima, skladištima i maloprodajnim objektima, poslovnim prostorima, kao i javni objektima, kao što su bolnice, hoteli, zatvori i pozorišta, komercijalnim objektima-prodavnice, fabrike, radionice, avioni, javna prevozna sredstva.

Goliath® Gel je najefikasniji ukoliko se nanese što bliže mestima na kojima se štetni insekti kreću, razmnožavaju i hrane. Ovi mesta su obično tamna, topla, vlažna i zaštićena, npr iza frižidera i drugih električnih aparata.

Pronadite takva mesta odgovarajućim tehnikama, kao što su posmatranje ili hvatanje. Za najbolje rezultate mesto koja se tretira treba očistiti pre primene, posebno obraćajući pažnju na uklanjanje alternativnih izvora hrane.

Patrone Goliath® Gel su dizajnirane tako da se se primenjuju pomoću mehaničkog aplikatora u vidu pištolja (BaitGun®). Pričvrstite patronu Goliath® Gel u BaitGun® pištolj i pogledajte odgovarajuće uputstvo za upotrebu proizvođača o korišćenju BaitGun®.

Goliath® Gel treba primeniti u celoj zaraženoj oblasti u vidu malih kapi. Kapi gela treba aplikirati u mraku na slabo dostupnim mesima, u pukotine, iza ormara i polica, ispod kuhinjskih aparata, u električnim kontrolnim kutijama, iza sprovodnih cevi i ispod elemenata u kupatilu, itd.

Nemojte nanositi Goliath® Gel, gde se može pokvasiti ili isprati ili biti uklonjen tokom rutinskog čišćenja. Nemojte prskati insekticide na ili oko Goliath® Gel ili na nedavno tretiranim površinama, jer to može obeshrabriti bubašvabe da se hrane njime.

Ako Goliath® Gel kontaminira neciljane površine uklonite gel vlažnim papirnim ubrusom i ubacite ga u domaće smeće. Očistite površinu temeljno. Bubašvabe će obično uginuti nekoliko sati posle jednog hranjenja Goliath® Gel. U tretiranim prostorijama, mrtve bubašvabe će biti vidljive obično u roku od 24 sata posle primene.

Tretirana površina treba da bude ponovo pregledana posle 1-2 nedelje. Tamo gde je početna zaraza bila teška druga aplikacija Goliath® Gel se može primeniti ako su žive bubašvabe i dalje prisutne.

Doza primene

U slučajevima teške infestacije i na mestima koja su naročito prljiva ili pretrpana ili gde se alternativni izvori hrane ne mogu u potpunosti eliminisati koristiti višu dozu primene

Standardna doza:

1 kap, odn. 0,03g/ m²- smeđa bubašvaba

2 kapi, odn. 2x0,03g/m²- smeđa i obična bubašvaba

Viša doza (u slučaju više infestacije i veće zaprljanosti lokaliteta):

2 kap, odn. 0,03g/ m²- smeđa bubašvaba

3 kapi, odn. 2x0,03g/m²- smeđa i obična bubašvaba

NAPOMENA: 1 kap je prosečno 3-4 mm u prečniku

Skladištenje i odlaganje

Skladišti Goliath® Gel patronе u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane za ljudе i hrane za životinje, na prohладnom i suvom mestu, pod klučem, van domaćaja dece. Držati dalje od izvora topote i zaštiti od sunca.

Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača. Kada je prazna ambalaža, odložite je na bezbedan način. Zabranjeno je ponovo koristiti ispraznjenu ambalažu ili tu ambalažu koristiti u neke druge svrhe! Ovaj proizvod i njegova ambalaža moraju biti uklonjene na bezbedan način u skladu sa lokalnim propisima koji regulišu ovu oblast.

Mere opreza

Odmah isprati vodom u slučaju da dospe u kontakt sa kožom ili očima. Operite ruke pre jela i posle upotrebe. Ovaj proizvod sadrži supstance koje se zna da su opasne po životnu sredinu. Ne dozvoliti da dospe na zemljušte, ili vodene površine, kao ni u kanalizaciju.

Mere u slučaju ispuštanja u životnu sredinu

Ako dođe do prosipanja: Nosite propisanu zaštitnu odeću. Sakupite odmah u slučaju prosipanja. Sakupiti u slučaju prosipanja, počistiti ili pokupiti lopatom. Sakupite kontaminirani materijal i odložite u obeležen kontejner za odlaganje. Temeljno operite površinu od prosipanja. Operite temeljno ruke odmah nakon rukovanja prosvitnim materijalom.

Zaštita životne sredine: Ne dopustiti zagadjenje javnih površina ili kanalizacije ili podzemnih voda. Cuvati odvojeno od hrane za ljudе i životinje.

Rukovanje i skladištenje

Rukovanje: Nikakve posebne mere zaštite prilikom rukovanja nisu neophodne ako se proizvod koristi ispravno. Kada ga koristite, ne jesti, ne piti i ne pušti.

Zaštita od požara i eksplozije: proizvod nije zapaljiv. U slučaju požara: pogodne supstance za gašenje požara: voda u spreju, voda u obliku magle, ugljen dioksid, pena ili mediji za suvo gašenje. Mogući štetni gasovi uz vatru: ugljen monoksid, ugljen dioksid, vodonik-hlorid, vodonik, azotni oksidi, sumpor oksidi.

Lična zaštitna oprema

Zaštita ruku: Zaštitne rukavice napravljene od nitrilne gume najmanje 0.5mm debeline ili od viton, butilne gume, neoprena i PVC mogu da ponude dobru zaštitu. Rukavice moraju da zaštite celu ruku i zglobove i ponovno korišćenje ovih rukavica zavisi od količine materijala koji je prosut i odmah opran. Rukavice treba temeljno oprati posle svakog rada sa njima.

Opšta bezbednost i higijenske mere: Uobičajene mere opreza pri rukovanju hemikalijama moraju se poštovati.

Fizičke i hemijske osobine: gel, braon boje, bez mirisa

Toksikološke informacije

Niska toksičnost (LD50 oralna (pacov): 4400 mg / kg)

Nije iritativan za kožu (LD50 dermalna (pacov):> 5000 mg / kg)

Udisanje pare verovatno neće izazvati problem (LD50 inhalacija (pacov): 0.682 mg / l / 4h)

Blago je iritativan za oči. Izbegavajte nepotreban kontakt sa proizvodom.

Ostale informacije Centar za kontrolu trovanja VMA (24h),

Tel. + 381 11 36 08 440

International emergency number, telefon: +49 180 2273-112

Mere prve pomoći

Generalni savet: Ako osoba misli da je bila izložena ovom proizvodu i loše se oseća, pozovite lekaru ili je odvedite u bolnicu. Uklonite svu kontaminiranu odeću. Držite je u mirovanju udaljenu od izvora kontaminacije. Ne dozvolite joj da puši ili jede. Prvo treba da se ukloni uprjalnu odeću, ako je neophodno. U slučaju kontakta sa očima odmah isprati oči barem 15 minuta pod vodom teče, sa otvorenim kapcima. U slučaju kontakta sa kožom odmah skinuti svu kontaminiranu odeću i obuću i ispratu kožu sa dosta vode. Zahvaćenu površinu temeljno operite sapunom i vodom što je pre moguće. U slučaju gutanja odmah isprati usta, popiti dosta vode. Potražiti pomoć lekara odmah. U slučaju udisanja preporučuje se mirovanje, sklanjanje osobe na svež vazduh, i zatim pozvati medicinsku pomoć. Ako postoji opasnost od gubitka svesti, stavite osobu u položaj za oporavak. Primena veštačkog disanja po potrebi, ali mora se voditi računa da se izbegne kontaminacija osobe koja ukazuje prvu pomoć.

Uputstvo za lekaru - opšti saveti

Aktivna supstanca: Fipronil je iz grupe pirazol fenil insekticida.

Toksični efekti: Ova supstanca je niske opšte toksičnosti.

Simptomi u slučaju nenamernog izlaganja: Uznemirenost, anksioznost, tremor.



BASF
The Chemical Company